

がん種

尿路上皮

レジメン名

**Avelumab**

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
アセトアミノフェン錠	600mg	経口		d1	14日
クロルフェニラミン	5mg	点滴静注	30分	d1	
アベルマブ	10mg/kg	点滴静注	60分	d1	

がん種

腎細胞

レジメン名

**Axitinib + Avelumab**

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
アセトアミノフェン錠	600mg	経口		d1	14日
クロルフェニラミン	5mg	点滴静注	30分	d1	
アベルマブ	10mg/kg	点滴静注	60分	d1	
アキシチニブ	10mg	経口	分2	連日	

がん種

腎細胞

レジメン名

**Axitinib+Pembrolizumb**

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ペンプロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日
アキシチニブ	10mg	経口	分2	連日	

がん種

**精巣**

レジメン名

**BEP**

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
細胞外液	500mL	点滴静注	90分	d1-5	21日
グラニセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	1mg 6.6mg 150mg (d1のみ)	点滴静注	30分	d1-5	
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1-5	
フロセミド	10mg	静注	緩徐に	d1-5	
シスプラチン	20mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1-5	
ブレオマイシン	30mg	点滴静注	10分	d2,9,16	
細胞外液	500mL	点滴静注	90分	d1-5	

がん種

前立腺

レジメン名

**Cabazitaxel(G-CSF)**

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	6.6mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1	21日
カバジタキセル	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1	
ペグフィルグラスチム	3.6mg	皮下注射	-	d3	
プレドニゾン錠	10mg	経口	分2 朝昼食後	連日	

がん種

腎細胞

レジメン名

**Cabozantinib+Nivolumab**

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ニボルマブ	240mg(480mg)	点滴静注	30分	d1	14日(28日)
カボザンチニブ	40mg	経口	分1	連日	

がん種

尿路上皮

レジメン名

CBDCA+PTX

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	19.8mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1	21日
パロノセトロン ホスアプレピタント	0.75mg 150mg	点滴静注	30分	d1	
パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	d1	
カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	60分	d1	

がん種

精巣

レジメン名

CDDP+VP-16

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
細胞外液	500mL	点滴静注	90分	d1-5	21日
グラニセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	1mg 6.6mg 150mg (d1のみ)	点滴静注	30分	d1-5	
エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1-5	
フロセミド	10mg	静注	緩徐に	d1-5	
シスプラチン	20mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1-5	
細胞外液	500mL	点滴静注	90分	d1-5	



がん種

前立腺

レジメン名

DOC+PSL

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1	21日
プレドニゾン錠	10mg	経口	分2 朝昼食後	連日	

がん種

腎細胞

レジメン名

**Enfortumab Vedotin**

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
パドセブ	1.25mg/kg	点滴静注	30分	d1,8,15	28日

がん種

尿路上皮

レジメン名

GEM + CBDCA

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 4.95mg 150mg	点滴静注	30分	d1	21日
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d8	
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1,8	
カルボプラチン	AUC=4.5	点滴静注	60分	d1	

がん種

尿路上皮

レジメン名

GEM + CDDP

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1,5,8	21日
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1,8	
維持液・生理食塩液	1000mL	点滴静注	180分	d2	
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d2	
シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	d2	
フロセミド	20mg	点滴静注	5分	d2	
維持液	1000mL	点滴静注	180分	d2	
デキサメタゾン（維持液）	6.6mg（1500mL）	点滴静注	270分	d3-4	

がん種

尿路上皮

レジメン名

GEM

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1.8.15	28日
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1.8.15	

がん種

尿路上皮

レジメン名

GEM+PTX

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	19.8mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1	21日
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d8	
パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	d1	
ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1,8	

がん種

腎細胞

レジメン名

**Lenvatinib+Pembrolizumb(3w)**

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ペンプロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日
レンバチニブ	20mg	経口	分1	連日	

がん種

**腎細胞**

レジメン名

**Lenvatinib+Pembrolizumb(6w)**

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ペンプロリズマブ	400mg	点滴静注	30分	d1	42日
レンバチニブ	20mg	経口	分1	連日	



がん種

尿路上皮

レジメン名

M-VEC

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
メトトレキサート	30mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	d1	28日
維持液・生理食塩液	1000mL	点滴静注	180分	d2	
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d2	
ビンブラスチン	3mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	10分	d2	
エピルビシン	30mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	d2	
シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	120分	d2	
フロセミド	20mg	点滴静注	5分	d2	
維持液	1000mL	点滴静注	180分	d2	
デキサメタゾン（維持液）	6.6mg（1500mL）	点滴静注	270分	d3-4	
デキサメタゾン	6.6mg	静脈内投与	15分	d5	

がん種

膀胱(膀注)

レジメン名

THP

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
テラルピシン	30mg	膀胱内注入	-	d1	7日

がん種

**腎細胞**

レジメン名

**Nivolumab(2w)**

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	d1	14日

がん種

腎細胞

レジメン名

**Nivolumab(4w)**

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ニボルマブ	480mg	点滴静注	30分	d1	28日

がん種

腎細胞

レジメン名

**Nivolumab+Ipilimumab**

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	d1	21日
イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	d1	

がん種

腎細胞・尿路上皮

レジメン名

**Pembrolizumab(3w)**

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注	30分	d1	21日

がん種

腎細胞・尿路上皮

レジメン名

**Pembrolizumab(6w)**

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ペムブロリズマブ	400mg/Body	点滴静注	30分	d1	42日

がん種

尿路上皮

レジメン名

(RT)GEM

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1	7日
ゲムシタビン	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1	