

がん種

メルケル細胞

レジメン名

Avelumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
アセトアミノフェン錠	600mg	経口		d1	14日
クロルフェニラミン	5mg	点滴静注	30分	d1	
アベルマブ	10mg/kg	点滴静注	60分	d1	

がん種

有棘細胞

レジメン名

CA(CDDP+DXR)

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
維持液・生理食塩液	1000mL	点滴静注	180分	d1	21日
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d1	
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	120分	d1	
フロセミド	20mg	点滴静注	5分(全開)	d1	
維持液	1000mL	点滴静注	180分	d1	
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d2	
ドキソルビシン	40mg/m ²	点滴静注	5分(全開)	d2	
維持液	1500mL	点滴静注	270分	d2	
維持液 デキサメタゾン	1500mL 6.6mg	点滴静注	270分	d3	
デキサメタゾン錠	8mg	経口	分2 朝夕食後(朝昼食後)	d4,5	

がん種

悪性黒色腫

レジメン名

CBDCA+PTX

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	19.8mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1	21日
パロノセトロン ホスアプレピタント	0.75mg 150mg	点滴静注	30分	d1	
パクリタキセル	200mg/m ²	点滴静注	180分	d1	
カルボプラチン	AUC=6	点滴静注	60分	d1	

がん種

有棘細胞

レジメン名

CBDCA+EPI

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 4.95mg 150mg	点滴静注	30分	d1	21日
カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	60分	d1	
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d2	
エピルビシン	60mg/m ²	点滴静注	5分 (全開)	d2	

がん種

悪性黒色腫

レジメン名

weekly(CBDCA+PTX)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	6.6mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1,8,15	28日
グラニセトロン	1mg	点滴静注	30分	d1,8,15	
パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	60分	d1,8,15	
カルボプラチン	AUC=2	点滴静注	60分	d1,8,15	

がん種

CTCL

レジメン名

THP-COP

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
プレドニゾン パロノセトロン ホスアプレピタント	40mg 0.75mg 150mg	点滴静注	30分	d1	21日
ビンクリスチン	1mg/m ²	点滴静注	5分（全開）	d1	
ピラルビシン	30mg/m ²	点滴静注	30分	d1	
シクロホスファミド	500mg/m ²	点滴静注	120分	d1	
プレドニゾン錠	40mg	経口		d2-5	

がん種

CTCL

レジメン名

CHOP(G-CSF)

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
プレドニゾン パロノセトロン ホスアプレピタント	100mg 0.75mg 150mg	点滴静注	30分	d1	21日
ビンクリスチン	1.4mg/m ²	点滴静注	5分（全開）	d1	
ドキシソルビシン	50mg/m ²	点滴静注	30分	d1	
シクロホスファミド	750mg/m ²	点滴静注	120分	d1	
ペグフィルグラスチム	3.6mg	皮下注射	－	d4	
プレドニゾン錠	100mg	経口		d2-5	

がん種

有棘細胞

レジメン名

CPT-11 weekly

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
グラニセトロン デキサメタゾン	1mg 6.6mg	点滴静注	30分	d1,8,15	28日
イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注	90分	d1,8,15	

がん種

血管肉腫

レジメン名

DOC weekly

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1,8,15	28日
ドセタキセル	25mg/m ²	点滴静注	60分	d1,8,15	

がん種

悪性黒色腫

レジメン名

DTIC

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
グラニセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	1mg 6.6mg 150mg	点滴静注	30分	d1	28日
グラニセトロン デキサメタゾン	1mg 6.6mg	点滴静注	30分	d2-4	
ダカルバジン	250mg/m ²	点滴静注	15分	d1-5	

がん種

軟部肉腫

レジメン名

Eribulin

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注	5分	d1,8	21日

がん種

CTCL

レジメン名

GEM

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1,8,15	28日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	d1,8,15	

がん種

悪性黒色腫

レジメン名

Nivolumab+Ipilimumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ニボルマブ	80mg/body	点滴静注	30分	d1	21日
イピリムマブ	3mg/kg	点滴静注	90分	d1	

がん種

悪性黒色腫

レジメン名

Ipilimumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
イピリムマブ	3mg/kg	点滴静注	90分	d1	21日

がん種

CTCL

レジメン名

Mogamulizumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
アセトアミノフェン錠	500mg	経口	ルート確保時	d1,8,15,22,29,43,57...	1週間毎5回その後2週間毎
ヒドロコルチゾンコハク酸エステル	100mg	点滴静注	15分	d1,8,15,22,29,43,57...	
クロルフェニラミン	5mg	点滴静注	15分	d1,8,15,22,29,43,57...	
モガムリズマブ	1mg/kg	点滴静注	120分	d1,8,15,22,29,43,57...	

がん種

悪性黒色腫

レジメン名

Nivolumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	d1	14日

がん種

悪性黒色腫

レジメン名

Pembrolizumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	d1	21日

がん種

血管肉腫

レジメン名

PTX weekly

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	6.6mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1	7日
パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	60分	d1	

がん種

軟部肉腫

レジメン名

AI(DXR+IFO)(G-CSF)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
開始液	500mL	点滴静注	240分	d1-7	21日
グラニセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	1mg 9.9mg 150mg	点滴静注	(開始液投与60分後に側管) 30分	d1	
グラニセトロン デキサメタゾン	1mg 9.9mg	点滴静注	(側管) 30分	d2-5	
ドキシソルピシン	30mg/m ²	点滴静注	(側管) 120分	d1,2	
イホスファミド	2000mg/m ²	点滴静注	(側管) 240分	d1-5	
維持液 炭酸水素ナトリウム7% メスナ	1000mL 40mL 1200mg/m ²	点滴静注	480分	d1-6 (d6メスナなし)	
維持液 炭酸水素ナトリウム7%	500mL 20mL	点滴静注	240分	d1-6	
生理食塩液 炭酸水素ナトリウム7%	1000mL 60mL	点滴静注	480分	d1-6	
ペグフィルグラスチム	3.6mg	皮下注射	-	d7	