

がん種

乳

レジメン名

Atezolizumab+nab-PTX

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
アテゾリズマブ	840mg/body	点滴静注	60分（2回目以降30分まで短縮可）	d1,15	28日
パクリタキセル（Alb懸濁型）	100mg/m ²	点滴静注	30分	d1,8,15	

がん種

乳

レジメン名

BEV+PTX weekly

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	6.6mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1,8,15	28日
ベバシズマブ	10mg/kg	点滴静注	初回90分→60分→30分（コース毎短縮可）	d1,15	
パクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注	60分	d1,8,15	

がん種

乳

レジメン名

Cape+Pertuzumab+Trastuzumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ペルツズマブ	初回 840mg/body 継続 420mg/body	点滴静注	60分（2回目以降30分まで短縮可）	d1	21日
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 継続 6mg/kg	点滴静注	90分（2回目以降30分まで短縮可）	d1	
カペシタビン	2000mg/m ²	点滴静注	分2 朝夕食後	d1夕-d15朝	

がん種

乳

レジメン名

CPT-11 weekly

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
グラニセトロン デキサメタゾン	1mg 6.6mg	点滴静注	30分	d1,8,15	28日
イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注	90分	d1,8,15	

がん種

乳

レジメン名

DOC

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1	21日
ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	60分	d1	
デキサメタゾン	8mg	経口	分2 朝夕食後	d1夕-d3朝	

がん種

乳

レジメン名

DOC+Trastuzumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1	21日
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 継続 6mg/kg	点滴静注	90分（2回目以降30分まで短縮可）	d1	
ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	60分	d1	
デキサメタゾン	8mg	経口	分2 朝夕食後	d1夕-d3朝	

がん種

乳

レジメン名

EC

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d1	21日
エピルビシン	90mg/m ²	点滴静注	5分	d1	
シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	30分	d1	

がん種

乳

レジメン名

dose dense EC (G-CSF)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d1	14日
エピルビシン	90mg/m ²	点滴静注	5分	d1	
シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	30分	d1	
ペグフィルグラスチム	3.6mg	皮下注	－	d3	

がん種

乳

レジメン名

Eribulin

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注	5分	d1,8	21日

がん種

乳

レジメン名

Eribulin+Trastuzumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 継続 6mg/kg	点滴静注	90分（2回目以降30分まで短縮可）	d1	21日
エリブリン	1.4mg/m ²	点滴静注	5分	d1,8	

がん種

乳

レジメン名

FEC

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d1	21日
エピルビシン	100mg/m ²	点滴静注	5分	d1	
シクロホスファミド	500mg/m ²	点滴静注	30分	d1	
フルオロウラシル	500mg/m ²	点滴静注	15分	d1	

がん種

乳

レジメン名

GEM

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1,8	21日
ゲムシタビン	1250mg/m ²	点滴静注	30分	d1,8	

がん種

乳

レジメン名

GEM+Trastuzumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1,8	21日
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 継続 6mg/kg	点滴静注	90分（2回目以降30分まで短縮可）	d1	
ゲムシタビン	1250mg/m ²	点滴静注	30分	d1,8	

がん種

乳

レジメン名

dose dense PTX (G-CSF)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	19.8mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1	14日
パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注	180分	d1	
ペグフィルグラスチム	3.6mg	皮下注	—	d3	

がん種

乳

レジメン名

PTX weekly × 12

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	6.6mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1,8,15,22,29,36 43,50,57,64,71,78	84日
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分	d1,8,15,22,29,36 43,50,57,64,71,78	

がん種

乳

レジメン名

PTX weekly × 12 + Tmab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	6.6mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1,8,15,22,29,36 43,50,57,64,71,78	84日
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 継続 6mg/kg	点滴静注	90分（2回目以降30分まで短縮可）	d1,22,43,64	
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分	d1,8,15,22,29,36 43,50,57,64,71,78	

がん種

乳

レジメン名

Pertuzumab+DOC+Trastuzumab(G-CSF)

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ペルツズマブ	初回 840mg/body 継続 420mg/body	点滴静注	60分（2回目以降30分まで短縮可）	d1	21日
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1	
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 継続 6mg/kg	点滴静注	90分（2回目以降30分まで短縮可）	d1	
ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	60分	d1	
ペグフィルグラスチム	3.6mg	皮下注	－	d3	
デキサメタゾン	8mg	経口	分2 朝	d2-3	

がん種

乳(TNBC)

レジメン名

Pembrolizumab+CBDCA+PTX

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注	30分	d1	21日
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	6.6mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1,8,15	
パロノセトロン ホスアプレピタント	0.75mg 150mg	点滴静注	30分	d1	
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分	d1,8,15	
カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	60分	d1	

がん種

乳(TNBC)

レジメン名

Pembrolizumab+EC

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注	30分	d1	21日
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d1	
エピルビシン	90mg/m ²	点滴静注	5分	d1	
シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	30分	d1	

がん種

乳(TNBC)

レジメン名

Pembrolizumab(3w)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注	30分	d1	21日

がん種

乳(TNBC)

レジメン名

Pembrolizumab(6w)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ペムブロリズマブ	400mg/Body	点滴静注	30分	d1	42日

がん種

乳

レジメン名

Pembrolizumab+GEM+CBDCA

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注	30分	d1	21日
グラニセトロン デキサメタゾン	1mg 6.6mg	点滴静注	30分	d1,8	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	d1,8	
カルボプラチン	AUC=2	点滴静注	60分	d1,8	

がん種

乳

レジメン名

Pembrolizumab+PTX weekly

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注	30分	3週毎	28日
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	6.6mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1,8,15	
パクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注	60分	d1,8,15	

がん種

乳

レジメン名

S-1+Trastuzumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 継続 6mg/kg	点滴静注	90分 (2回目以降30分まで短縮可)	d1	21日
S-1	80mg/m ²	経口	分2 朝夕食後	d1-14	

がん種

乳

レジメン名

TC(DOC+CPA)(G-CSF)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg 13.2mg	点滴静注	30分	d1	21日
ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	60分	d1	
シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	30分	d1	
ペグフィルグラスチム	3.6mg	皮下注	-	d3	
デキサメタゾン	8mg	経口	分2 朝夕食後	d1夕-d4朝	

がん種

乳

レジメン名

TC(DOC+CPA)+Trastuzumab(G-CSF)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
パロノセトロン デキサメタゾン	0.75mg 13.2mg	点滴静注	30分	d1	21日
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 継続 6mg/kg	点滴静注	90分 (2回目以降30分まで短縮可)	d1	
ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	60分	d1	
シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	30分	d1	
ペグフィルグラスチム	3.6mg	皮下注	-	d3	
デキサメタゾン	8mg	経口	分2 朝夕食後	d1夕-d4朝	

がん種

乳

レジメン名

T-DM1

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
トラスツズマブエムタンシン	3.6mg/kg	点滴静注	90分（2回目以降30分まで短縮可）	d1	21日

がん種

乳

レジメン名

Trastuzumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 継続 6mg/kg	点滴静注	90分（2回目以降30分まで短縮可）	d1	21日

がん種

乳

レジメン名

nab-PTX

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1	21日
パクリタキセル (Alb懸濁型)	260mg/m ²	点滴静注	30分	d1	

がん種

乳

レジメン名

nab-PTX+Trastuzumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1	21日
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 継続 6mg/kg	点滴静注	90分（2回目以降30分まで短縮可）	d1	
パクリタキセル（Alb懸濁型）	260mg/m ²	点滴静注	30分	d1	

がん種

乳

レジメン名

VNR+Pertuzumab+Trastuzumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ペルツズマブ	初回 840mg/body 継続 420mg/body	点滴静注	60分（2回目以降30分まで短縮可）	d1	21日
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 継続 6mg/kg	点滴静注	90分（2回目以降30分まで短縮可）	d1(1コース目のみd2)	
ロゼウス	初回 25mg/kg 継続 30mg/kg	点滴静注	5分	d1,8(1コース目のみd2,9)	