

がん種

尿路上皮

レジメン名

Avelumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
アセトアミノフェン錠	600mg	経口		d1	14日
クロルフェニラミン	5mg	点滴静注	30分	d1	
アベルマブ	10mg/kg	点滴静注	60分	d1	

がん種
腎細胞

レジメン名
Axitinib + Avelumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
アセトアミノフェン錠	600mg	経口		d1	14日
クロルフェニラミン	5mg	点滴静注	30分	d1	
アベルマブ	10mg/kg	点滴静注	60分	d1	
アキシチニブ	10mg	経口	分2	連日	

がん種

腎細胞

レジメン名

Axitinib+Pembrolizumb

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ペンプロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日
アキシチニブ	10mg	経口	分2	連日	

がん種
精巣
レジメン名
BEP

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
細胞外液	500mL	点滴静注	90分	d1-5	21日
グラニセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	1mg 6.6mg 150mg (d1のみ)	点滴静注	30分	d1-5	
エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	60分	d1-5	
フロセミド	10mg	静注	緩徐に	d1-5	
シスプラチン	20mg/m ²	点滴静注	60分	d1-5	
ブレオマイシン	30mg	点滴静注	10分	d2,9,16	
細胞外液	500mL	点滴静注	90分	d1-5	

がん種

前立腺

レジメン名

Cabazitaxel(G-CSF)

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	6.6mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1	21日
カバジタキセル	25mg/m ²	点滴静注	60分	d1	
ペグフィルグラスチム	3.6mg	皮下注射	－	d3	
プレドニゾン錠	10mg	経口	分 2 朝昼食後	連日	

がん種

腎細胞

レジメン名

Cabozantinib+Nivolumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ニボルマブ	240mg(480mg)	点滴静注	30分	d1	14日(28日)
カボザンチニブ	40mg	経口	分1	連日	

がん種
尿路上皮

レジメン名
CBDCA+PTX

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	19.8mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1	21日
パロノセトロン ホスアプレピタント	0.75mg 150mg	点滴静注	30分	d1	
パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注	180分	d1	
カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	60分	d1	

がん種

精巣

レジメン名

CDDP+VP-16

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
細胞外液	500mL	点滴静注	90分	d1-5	21日
グラニセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	1mg 6.6mg 150mg (d1のみ)	点滴静注	30分	d1-5	
エトポシド	100mg/m ²	点滴静注	60分	d1-5	
フロセミド	10mg	静注	緩徐に	d1-5	
シスプラチン	20mg/m ²	点滴静注	60分	d1-5	
細胞外液	500mL	点滴静注	90分	d1-5	

がん種

前立腺

レジメン名

Darolutamide+DOC+PSL

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注	60分	d1	21日
プレドニゾン錠	10mg	経口	分2 朝昼食後	連日	
ダロルタミド	1200mg/body	経口	分2 朝夕食後	連日	

がん種

前立腺

レジメン名

DOC+PSL

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注	60分	d1	21日
プレドニゾン錠	10mg	経口	分2 朝昼食後	連日	

がん種

腎細胞

レジメン名

Enfortumab Vedotin

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
パドセブ	1.25mg/kg	点滴静注	30分	d1,8,15	28日

がん種
尿路上皮癌
レジメン名
Enfortumab Vedotin+Pembrolizumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
パドセブ	1.25mg/kg	点滴静注	30分	d1,8	21日
ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注	30分	d1	

がん種
尿路上皮
レジメン名
GEM + CBDCA

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 4.95mg 150mg	点滴静注	30分	d1	21日
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d8	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	d1,8	
カルボプラチン	AUC=4.5	点滴静注	60分	d1	

がん種

尿路上皮

レジメン名

GEM + CDDP

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1,5,8	21日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	d1,8	
維持液・生理食塩液	1000mL	点滴静注	180分	d2	
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d2	
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	120分	d2	
フロセミド	20mg	点滴静注	5分	d2	
維持液	1000mL	点滴静注	180分	d2	
デキサメタゾン（維持液）	6.6mg（1500mL）	点滴静注	270分	d3-4	

がん種
尿路上皮
レジメン名
GEM

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1.8.15	28日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	d1.8.15	

がん種
尿路上皮

レジメン名
GEM+PTX

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	19.8mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1	21日
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d8	
パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注	180分	d1	
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分	d1,8	

がん種

腎細胞

レジメン名

Lenvatinib+Pembrolizumb(3w)

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ペンプロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日
レンバチニブ	20mg	経口	分1	連日	

がん種

腎細胞

レジメン名

Lenvatinib+Pembrolizumb(6w)

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ペンプロリズマブ	400mg	点滴静注	30分	d1	42日
レンバチニブ	20mg	経口	分1	連日	

がん種
尿路上皮
レジメン名
M-VEC

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
メトトレキサート	30mg/m ²	点滴静注	90分	d1	28日
維持液・生理食塩液	1000mL	点滴静注	180分	d2	
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d2	
ビンブラスチン	3mg/m ²	点滴静注	10分	d2	
エピルビシン	30mg/m ²	点滴静注	5分	d2	
シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注	120分	d2	
フロセミド	20mg	点滴静注	5分	d2	
維持液	1000mL	点滴静注	180分	d2	
デキサメタゾン（維持液）	6.6mg（1500mL）	点滴静注	270分	d3-4	
デキサメタゾン	6.6mg	静脈内投与	15分	d5	

がん種
膀胱(膀注)
レジメン名
THP

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
テラルピシン	30mg	膀胱内注入	－	d1	7日

がん種
腎細胞 尿路上皮
レジメン名
Nivolumab(2w)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	d1	14日

がん種
腎細胞 尿路上皮
レジメン名
Nivolumab(4w)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ニボルマブ	480mg	点滴静注	30分	d1	28日

がん種

腎細胞

レジメン名

Nivolumab+Ipilimumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	d1	21日
イピリムマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	d1	

がん種

腎細胞・尿路上皮

レジメン名

Pembrolizumab(3w)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ペムブロリズマブ	200mg/Body	点滴静注	30分	d1	21日

がん種

腎細胞・尿路上皮

レジメン名

Pembrolizumab(6w)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ペムブロリズマブ	400mg/Body	点滴静注	30分	d1	42日

がん種
尿路上皮
レジメン名
(RT)GEM

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1	7日
ゲムシタビン	100mg/m ²	点滴静注	30分	d1	