

がん種
頭頸部
レジメン名
CBDCA+5-FU+Cetuximab

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
デキサメタゾン クロルフェニラミン	4.95mg (d1) 6.6mg (d8,15) 5mg	点滴静注	15分	d1,8,15	21日
パロノセトロン ホスアプレピタント	0.75mg 150mg	点滴静注	30分	d1	
セツキシマブ	初回 400mg/m2 継続 250mg/m2	点滴静注	初回 120分 継続 60分	d1,8,15	
フルオロウラシル	1000mg/m ²	点滴静注	24時間	d1-4	
カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	60分	d1	
デキサメタゾン	3.3mg	点滴静注	15分	d2-4	

がん種

頭頸部

レジメン名

CBDCA+PTX+Cetuximab

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	6.6mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1,8,15,22,29,36,43,50	56日
グラニセトロン	1mg	点滴静注	30分	d1,8,15,22,29,36,43,50	
セツキシマブ	初回 400mg/m2 継続 250mg/m2	点滴静注	初回 120分 継続 60分	d1,8,15,22,29,36,43,50	
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分	d1,8,15,22,29,36,43,50	
カルボプラチン	AUC=1.5	点滴静注	60分	d1,8,15,22,29,36,43,50	

がん種

頭頸部

レジメン名

DOC+Tmab

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1	21日
トラスツズマブ	初回 8mg/kg 継続 6mg/kg	点滴静注	初回 90分（2回目以降30分まで短縮可） 継続 30分	d1	
ドセタキセル	70mg/m2	点滴静注	60分	d1	

がん種

頭頸部

レジメン名

FP（3週毎）

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
維持液・生理食塩液	1000mL	点滴静注	180分	d1	21日
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d1	
デキサメタゾン（維持液）	6.6mg（500mL）	点滴静注	90分	d2-3	
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d4-5	
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	24時間	d1-5	
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	120分	d1	
フロセミド	20mg	点滴静注	5分	d1	
維持液	1000mL	点滴静注	180分	d1-3	

がん種

頭頸部

レジメン名

FP（4週毎）

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
維持液・生理食塩液	1000mL	点滴静注	180分	d1	28日
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d1	
デキサメタゾン（維持液）	6.6mg（500mL）	点滴静注	90分	d2-3	
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d4-5	
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴静注	24時間	d1-5	
シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注	120分	d1	
フロセミド	20mg	点滴静注	5分	d1	
維持液	1000mL	点滴静注	180分	d1-3	

がん種

頭頸部

レジメン名

FP + Cmab

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
維持液	500mL	点滴静注	90分（朝7:30までに投与開始すること）	d1	21日
デキサメタゾン クロルフェニラミン	9.9mg 5mg	点滴静注	30分	d1	
デキサメタゾン クロルフェニラミン	6.6mg 5mg	点滴静注	30分	d8,15	
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	15分	d1	
生理食塩液	100mL	点滴静注	30分	d1,8,15	
セツキシマブ	初回 400mg/m ² 継続 250mg/m ²	点滴静注	初回 120分 継続 60分	d1,8,15	
生理食塩液	500mL	点滴静注	90分	d1	
パロノセトロン ホスアプレピタント	0.75mg 150mg	点滴静注	30分	d1	
デキサメタゾン（維持液）	6.6mg（500mL）	点滴静注	90分	d2-3	
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d4	
フルオロウラシル	1000mg/m ²	点滴静注	24時間	d1-4	
シスプラチン	100mg/m ²	点滴静注	120分	d1	
フロセミド	20mg	点滴静注	5分	d1	
維持液	1000mL	点滴静注	180分	d1-3	

がん種

頭頸部

レジメン名

PTX weekly+Cmab

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン	6.6mg 20mg 5mg	点滴静注	15分	d1	7日
生理食塩液	100mL	点滴静注	30分	d1	
セツキシマブ	初回 400mg/m2 継続 250mg/m2	点滴静注	初回 120分 継続 60分	d1	
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分	d1	

がん種

頭頸部

レジメン名

PTX weekly

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d1,8,15	28日
ファモチジン	20mg				
クロルフェニラミン	5mg				
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分	d1,8,15	

がん種
頭頸部
レジメン名
TPF

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
維持液・生理食塩液	1000mL	点滴静注	180分	d1	21日
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d1	
デキサメタゾン（維持液）	6.6mg（500mL）	点滴静注	90分	d2-3	
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d4-5	
ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	60分	d1	
フルオロウラシル	700mg/m ²	点滴静注	24時間	d1-5	
シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注	120分	d1	
フロセミド	20mg	点滴静注	5分	d1	
維持液	1000mL	点滴静注	180分	d1-3	

がん種

頭頸部

レジメン名

Nivolumab(2w)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ニボルマブ	240mg/body	点滴静注	30分	d1	14日

がん種

頭頸部

レジメン名

Nivolumab(4w)

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ニボルマブ	480mg/body	点滴静注	30分	d1	28日

がん種

頭頸部

レジメン名

Pembrolizumab

薬剤	用量	投与経路	投与時間	投与日	1コース
ペンブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	d1	21日

がん種

頭頸部

レジメン名

Pembrolizumab+CBDCA+5-FU

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
ペンプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	d1	21日
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 4.95mg 150mg	点滴静注	15分	d1	
フルオロウラシル	1000mg/m ²	点滴静注	24時間	d1-4	
カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	60分	d1	

がん種

頭頸部

レジメン名

Pembrolizumab+FP

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
維持液・生理食塩液	1000mL	点滴静注	180分	d1	21日
ペンプロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	d1	
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	30分	d1	
デキサメタゾン（維持液）	6.6mg（500mL）	点滴静注	90分	d2-3	
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d4-5	
フルオロウラシル	1000mg/m ²	点滴静注	24時間	d1-5	
シスプラチン	100mg/m ²	点滴静注	120分	d1	
フロセミド	20mg	点滴静注	5分	d1	
維持液	1000mL	点滴静注	180分	d1-3	

がん種

頭頸部

レジメン名

(RT)Pembrolizumab+CDDP

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
維持液・生理食塩液	1000mL	点滴静注	180分	d1	21日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注	30分	d1	
パロノセトロン デキサメタゾン ホスアプレピタント	0.75mg 9.9mg 150mg	点滴静注	15分	d1	
デキサメタゾン（維持液）	6.6mg（500mL）	点滴静注	90分	d2-3	
デキサメタゾン	6.6mg	点滴静注	15分	d4	
シスプラチン	100mg/m ²	点滴静注	120分	d1	
フロセミド	20mg	点滴静注	5分	d1	
維持液	1000mL	点滴静注	180分	d1-3	

がん種

頭頸部

レジメン名

(RT)CDDPweekly

薬剤	用量	投与経路	投与時間（用法）	投与日	1コース
維持液	500mL	点滴静注	60分	d1,8,15,22,29,36,43	49日
KCL	10mEq				
硫酸Mg補正液	10mEq				
パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	30分	d1,8,15,22,29,36,43	
デキサメタゾン	9.9mg				
シスプラチン	40mg/m ²	点滴静注	60分	d1,8,15,22,29,36,43	
フロセミド	20mg	点滴静注	5分（全開）	d1,8,15,22,29,36,43	
維持液	500mL	点滴静注	60分	d1,8,15,22,29,36,43	
KCL	10mEq				
硫酸Mg補正液	10mEq				
飲水	1000mL	経口	食事以外	d1,8,15,22,29,36,43	
デキサメタゾン	8mg	経口	分 2	d1,8,15,22,29,36,43	